

Orthoscalar representations of quivers on the category of Hilbert spaces. II.

Roiter A.V., Kruglyak S.A. and Nazarova L.A.

Abstract. As it is known, finitely presented quivers correspond to Dynkin graphs (Gabriel, 1972) and tame quivers – to extended Dynkin graphs (Donovan and Freislich, Nazarova, 1973). In the article "Locally scalar representations of graphs in the category of Hilbert spaces" (Func. Anal. and Appl., 2005) authors showed the way to transfer these results to Hilbert spaces, constructed Coxeter functors and proved an analogue of Gabriel theorem for locally scalar (orthoscalar in the sequel) representations (up to the unitary equivalence).

The category of orthoscalar representations of a quiver can be considered as a subcategory in the category of all representations (over a field $\mathbb{C}$). In the present paper we study the connection between indecomposable orthoscalar representations in the subcategory and in the category of all representations.

For the quivers, corresponded to extended Dynkin graphs, orthoscalar representations which cannot be obtained from the simplest by Coxeter functors (regular representations) are classified.

Введение

Более 30-ти лет назад (см. [1]) в работах И.М. Гельфанда, В.А. Пономарева, П. Габриеля и авторов было показано, что ряд проблем линейной алгебры (возникшие в теории представлений алгебр, теории групп и модулей Хариш—Чандра) допускают содержательное изучение как на наивном языке приведения наборов матриц теми или иными допустимыми преобразованиями, так и в категорно-функторных терминах. Отметим представления колчанов и частично упорядоченных множеств. Было доказано, в частности, что конечно-представимые (ручные) колчаны соответствуют графам (расширенным графам) Дынкина.

В [2] был указан путь перенесения этих результатов на представления колчанов в гильбертовых пространствах, построены функторы Кокстера и доказан аналог теоремы Габриеля [3] для локально-скалярных представлений

колчанов (в дальнейшем мы заменим термин "локально-скалярные представления" [2] на термин "ортоскалярные представления", считая его более удачным). В [2] доказано, что у колчанов, соответствующих расширенным графам Дынкина, размерности неразложимых ортоскалярных представлений не ограничены в совокупности (как следует из [4]-[6] расширенные графы Дынкина среди не конечно представимых и только они не имеют бесконечномерных неразложимых ортоскалярных представлений). Мы даём описание неразложимых ортоскалярных представлений для расширенных графов Дынкина (см. теоремы 1-3), указывая не только на их сходство, но и на отличие от неразложимых представлений таких графов в линейных пространствах (см. замечание 2).

1. О неразложимости в категории представлений колчана и её подкатегории ортоскалярных представлений

Напомним некоторые определения и факты (см. [7]) об ортоскалярных представлениях колчанов. Колчан Q с множеством вершин Q_v , $|Q_v| = N$, и множеством стрелок Q_a называется *разделённым*, если $Q_v = \overset{\circ}{Q} \sqcup \overset{\bullet}{Q}$, и для любой $\alpha \in Q_a$ её начало $t_\alpha \in \overset{\circ}{Q}$ и конец $h_\alpha \in \overset{\bullet}{Q}$. Колчан Q *однократный*, если при $\alpha \neq \beta$ либо $t_\alpha \neq t_\beta$, либо $h_\alpha \neq h_\beta$. Вершины из $\overset{\circ}{Q}$ будем называть *четными*, из $\overset{\bullet}{Q}$ — *нечётными*.

Пусть $m = |\overset{\bullet}{Q}|$, $n = |\overset{\circ}{Q}|$, $\overset{\bullet}{Q} = \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$, $\overset{\circ}{Q} = \{j_1, j_2, \dots, j_n\}$. Представление T колчана Q ставит в соответствие вершине $i \in Q_v$ конечномерное линейное пространство $T(i)$, а стрелке $\alpha : j \rightarrow i$, $\alpha \in Q_a$ линейное отображение $T_{ij} : T(j) \rightarrow T(i)$.

Представление T однократного разделённого колчана при фиксированных базисах пространств $T(i)$, $i \in Q_v$, можно ассоциировать с матрицей, разделённой на m горизонтальных и n вертикальных полос, т.е. блочной матрицей

$$T = [T_{i,jk}]_{k=\overline{1,n}, l=\overline{1,m}}.$$

При этом будем считать, что $T_{i,jk} = 0$, если не существует $\alpha \in Q_a$ такой, что $t_\alpha = j_k$, $h_\alpha = i_l$.

Пусть $\text{Rep} Q$ — категория представлений колчана Q , объекты которой есть представления, а морфизм представления T в представление $\tilde{T}$ определяется как семейство линейных отображений $C = \{C_i\}_{i \in Q_v}$, $C_i : T(i) \rightarrow \tilde{T}(i)$, таких, что для каждой $\alpha \in Q_a$ с $t_\alpha = j$, $h_\alpha = i$ диаграмма

$$\begin{array}{ccc} T(j) & \xrightarrow{T(\alpha)} & T(i) \\ \downarrow C_j & & \downarrow C_i \\ \tilde{T}(j) & \xrightarrow{\tilde{T}(\alpha)} & \tilde{T}(i) \end{array} \quad (1)$$

коммутативна, т.е. $C_i T_{ij} = \tilde{T}_{ij} C_j$.

Пусть представления $T, \tilde{T}$ заданы матрицами

$$T = [T_{i_l, j_k}]_{k=\overline{1, n}, l=\overline{1, m}} \quad \text{и} \quad \tilde{T} = [\tilde{T}_{i_l, j_k}]_{k=\overline{1, n}, l=\overline{1, m}}$$

Введём матрицы $A = \text{diag}\{C_{i_1}, C_{i_2}, \dots, C_{i_m}\}$, $B = \text{diag}\{C_{j_1}, C_{j_2}, \dots, C_{j_n}\}$. Тогда из коммутативности диаграмм (1) следует

$$AT = \tilde{T}B. \quad (2)$$

Будем в дальнейшем говорить, что $C = (A, B)$.

Пусть $\mathcal{H}$ — категория унитарных (конечномерных гильбертовых) пространств. Обозначим через $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$ подкатегорию в $\text{Rep}Q$, объекты которой есть представления T , для которых $T(i)$ — унитарные пространства ($i \in Q_v$), а морфизмы $C : T \rightarrow \tilde{T}$ — те из морфизмов в $\text{Rep}Q$, для которых, кроме (1), коммутативными будут и диаграммы

$$\begin{array}{ccc} T(j) & \xleftarrow{T(\alpha)^*} & T(i) \\ \downarrow C_j & & \downarrow C_i \\ \tilde{T}(j) & \xleftarrow{\tilde{T}(\alpha)^*} & \tilde{T}(i) \end{array} \quad (3)$$

т.е. будут выполняться равенства

$$AT = \tilde{T}B, \quad BT^* = \tilde{T}^*A \quad (4)$$

Представления $T, \tilde{T}$ из $\text{Rep}Q$ (соотв., из $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$) эквивалентны в $\text{Rep}Q$ (соотв., в $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$), если найдётся обратимый морфизм $C : T \rightarrow \tilde{T}$. Можно показать, что T и $\tilde{T}$ эквивалентны в $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$ тогда и только тогда, когда они унитарно эквивалентны (см., например, [8]), т.е. обратимый морфизм можно выбрать состоящим из унитарных матриц C_i .

$$\text{Обозначим } \vec{T}_i = [T_{i, j_1}; T_{i, j_2}; \dots; T_{i, j_n}], \quad T_j^\downarrow = \begin{bmatrix} T_{i_1, j} \\ T_{i_2, j} \\ \vdots \\ T_{i_m, j} \end{bmatrix}.$$

Представление T разделенного однократного колчана Q из категории $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$ назовём *ортоскалярным*, если каждому $i \in Q_v$ сопоставлено вещественное неотрицательное число χ_i , и выполняются следующие условия:

$$\vec{T}_i \cdot \vec{T}_i^* = \chi_i I_i \quad \text{при} \quad i \in \overset{\bullet}{Q}, \quad (5)$$

$$T_j^{\downarrow*} \cdot T_j^\downarrow = \chi_j I_j \quad \text{при} \quad j \in \overset{\circ}{Q}, \quad (6)$$

здесь I_i — матрица единичного оператора в $T(i)$. Ортоскалярной будем называть и матрицу представления T .

В определении представлений колчана Q в $\mathcal{H}$ можно было бы отказаться от конечномерности пространств $T(i)$, рассматривая и бесконечномерные представления.

Будем говорить, что Q (ортоскалярно) *конечнопредставим* в $\mathcal{H}$, если все его ортоскалярные представления распадаются в прямую сумму (конечную либо бесконечную) конечномерных представлений, размерности неразложимых представлений ограничены в совокупности и в каждой размерности число неразложимых представлений с данным характером конечно.

Определим категорию $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ как полную подкатеорию в $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$, объекты которой есть ортоскалярные представления колчана Q .

Обозначим через $\mathbb{R}^{G_v}$ линейное вещественное пространство из наборов $x = (x_i)$ действительных чисел x_i ($i \in G_v$), элементы x из $\mathbb{R}^{G_v}$ будем называть G -векторами.

Ортоскалярному представлению T разделённого однократного колчана Q сопоставим два N -мерных G -вектора ($N = m + n$): *размерность* $d = \{d(j)\}_{j \in Q_v}$ представления T , где $d(j) = \dim T(j)$, и *характер* $\chi = \{\chi(j)\}_{j \in Q_v}$, $\chi(j) = \chi_j$ определены выше (см. (5), (6)). Два ортоскалярных представления T и $\tilde{T}$ эквивалентны, если существуют такие унитарные матрицы $U = \text{diag}\{U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_m}\}$ и $V = \text{diag}\{V_{j_1}, V_{j_2}, \dots, V_{j_n}\}$, что

$$UT = \tilde{T}V, \quad \text{или} \\ \tilde{T}_{i_l, j_k} = U_{i_l} T_{i_l, j_k} V_{j_k}^*$$

Представление T будем называть *шуровским* (*brick*) в категории $\text{Rep} Q$ (соответственно $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$, $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$), если его кольцо эндоморфизмов в этой категории одномерно (изоморфно $\mathbb{C}$). Очевидно, если T — шуровское представление, то T неразложимо (в соответствующей категории). Если T — неразложимое в категории $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$, то оно в ней шуровское. Действительно алгебра $\mathfrak{A} = \text{End} T$ есть конечномерная $*$ -алгебра. Если $C = (A, B) \in \text{End} T$ то $C^* = (A^*, B^*)$. Если $C \in \text{Rad} \mathfrak{A}$, то $CC^* = (AA^*, BB^*) \in \text{Rad} \mathfrak{A}$ и CC^* — нильпотентный элемент, поэтому AA^*, BB^* нильпотентные и положительные операторы. Значит, $C = (0, 0)$, и алгебра $\mathfrak{A}$ полупростая. С другой стороны, алгебра $\mathfrak{A}$ — локальна, как алгебра эндоморфизмов неразложимого представления. Значит, $\mathfrak{A} \simeq \mathbb{C}$.

Представление T колчана Q называется *точным* если $T(i) \neq 0$ при всех $i \in Q_v$. *Носителем* представления T называется множество $Q_v^T = \{i \in Q_v \mid T(i) \neq 0\}$. Характер представления определён однозначно на носителе Q_v^T представления (и неоднозначно вне носителя). Если $Q_v^T = Q_v$, то характер ортоскалярного представления определён однозначно и обозначается χ_T , в общем случае обозначим через $\{\chi_T\}$ множество всех характеров представления T . Ясно, что если T и $\tilde{T}$ унитарно эквивалентны, то $\{\chi_T\} = \{\chi_{\tilde{T}}\}$.

Категория $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ есть (неполная) подкатеория категории $\text{Rep}(Q)$. Установим связь между неразложимыми объектами этих категорий. Основной вопрос: останется ли неразложимое ортоскалярное представление неразложимым в категории $\text{Rep}(Q)$, и поскольку, как мы отмечали, неразложимые в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ представления есть шуровские, останутся ли они шуровскими в категории $\text{Rep}(Q)$?

Второй пункт нижеприведенного утверждения доказан в [7].

Теорема 1. Пусть Q разделённый однократный колчан.

- (а) Если $T, \tilde{T} \in \text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ — представления с одинаковым характером и T эквивалентно $\tilde{T}$ в $\text{Rep}(Q)$, то T эквивалентно $\tilde{T}$ в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$;
- (б) Если T — неразложимое представление в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ то T — неразложимое, более того, шуровское и в $\text{Rep}(Q)$.

Доказательство теоремы 1 опирается на следующие вспомогательные утверждения.

Лемма 1. Пусть $C = (A, B)$ — морфизм представления T в $\tilde{T}$ в категории $\text{Rep}(Q)$, т.е. выполняется равенство

$$AT = \tilde{T}B,$$

и A, B есть унитарные отображения. Тогда $C = (A, B)$ есть морфизм представления T в представление $\tilde{T}$ и в категории $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ т.е. выполняются и равенства

$$BT^* = \tilde{T}^*A.$$

Доказательство. Из (2) следует $T^*A^* = B^*\tilde{T}^*$ или, учитывая унитарность A и B , имеем $T^*A^{-1} = B^{-1}\tilde{T}^*$. Поэтому

$$BT^* = \tilde{T}^*A.$$

□

Лемма 2. Пусть $C = (A, B)$ морфизм представления T в себя (эндоморфизм представления T) в категории $\text{Rep}(Q)$, т.е.

$$AT = TB \tag{7}$$

и A, B — самосопряжённые операторы. Тогда $C = (A, B)$ есть эндоморфизм представления T и в категории $\text{Rep}(Q, \mathcal{H})$, т.е. и

$$AT^* = T^*B. \tag{8}$$

Доказательство. Действительно, (8) получается из (7) операцией сопряжения. □

Лемма 3. ([7]) Пусть $Z = [z_{ij}]_{i=1, m, j=1, n}$, $W = [w_{ij}]_{i=1, m, j=1, n}$ — матрицы над полем $\mathbb{C}$, имеющие одинаковые положительные длины $(|\vec{x}|, |y^\perp|)$ соответствующих строк и соответствующих столбцов. Пусть $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \text{diag}\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ — матрицы над $\mathbb{R}$, $a_i > 0$, $b_j > 0$ при $i = 1, m$, $j = 1, n$, и пусть $AZ = WB$. Тогда $Z = W$.

Доказательство. Обозначим через K число ненулевых элементов в каждой из матриц Z, W . Доказательство леммы 3 проводится ([7]) индукцией по тройкам чисел (m, n, K) ; считая, что $(m_1, n_1, K_1) < (m_2, n_2, K_2)$, если $m_1 \leq m_2$, $n_1 \leq n_2$ и хотя бы одно неравенство строгое, либо если $m_1 = m_2$, $n_1 = n_2$,

но $K_1 < K_2$. Базу индукции получаем при $m = 1$, либо $n = 1$, либо $K = \max(m, n)$. $\square$

Доказательство теоремы 1.

(а) Пусть $C = (A, B)$ осуществляет эквивалентность представлений $T, \tilde{T}$ из $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ в категории $\text{Rep}(Q)$, т.е. $AT = \tilde{T}B$ (A и B обратимые матрицы). Пусть $A = XU$, $B = VY$ — полярные разложения матриц A и B , где U, V — унитарны, X, Y — положительные невырожденные матрицы (при этом можно считать, что U, V, X, Y имеют такую же блочно-диагональную структуру, как A и B). Пусть, кроме того,

$$X = U_1^* \tilde{X} U_1, \quad Y = V_1 \tilde{Y} V_1^*,$$

где U_1, V_1 — унитарные матрицы, $\tilde{X}, \tilde{Y}$ — диагональные матрицы с положительными числами на диагонали. Тогда

$$U_1^* \tilde{X} U_1 U T = \tilde{T} V V_1 \tilde{Y} V_1^* \quad (9)$$

или

$$\tilde{X}(U_1 U T V_1) = (U_1 \tilde{T} V V_1) \tilde{Y}.$$

Так как длины соответствующих строк и столбцов матриц $U_1 U T V_1$ и $U_1 \tilde{T} V V_1$ равны в силу предположений, то по лемме 3

$$U_1 U T V_1 = U_1 \tilde{T} V V_1,$$

а тогда, после сокращений,

$$U T = \tilde{T} V, \quad (10)$$

и представления T и $\tilde{T}$ эквивалентны в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ по лемме 1.

(б) Пусть T -шуровское представление в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ и $C = (A, B) \in \text{End} T$ в $\text{Rep}(Q)$. Можно считать, что A и B невырождены (прибавляя в случае необходимости к A и B подходящее кратное единичного оператора). Тогда по (10) при $T = \tilde{T}$ из того, что (U, V) есть эндоморфизм представления T в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$, следует что U и V кратны единичному оператору (с одним и тем же скаляром в качестве сомножителя). Сокращая равенство (9) на этот скаляр, мы получим

$$X T = T Y,$$

где X и Y — самосопряжённые операторы, а тогда по лемме 2 из-за шуровости T в $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ операторы X и Y скалярны (с одним и тем же скаляром); следовательно, такими будут и операторы $A = XU$ и $B = VY$. Значит T — неразложимое шуровское представление в $\text{Rep}(Q)$.

2. Размерности неразложимых ортоскалярных представлений

С колчаном Q связана форма Титса $q(x)$ на $\mathbb{R}^{Q_v}$: если $x \in \mathbb{R}^{Q_v}$, то

$$q(x) = \sum_{i \in Q_v} x_i^2 - \sum_{\alpha \in Q_a} x_{t_\alpha} x_{h_\alpha}.$$

Из работы [9] следует, что размерности неразложимых (в $\text{Rep}(Q)$) представлений колчана Q совпадают с положительными *корнями* соответствующего графа $G = G(Q)$, причём, для графов Дынкина и расширенных графов Дынкина такие корни совпадают в точности с решениями уравнений $q(x) = 1$ и $q(x) = 0, x \in \mathbb{Z}_+^{Q_v}$ (здесь $\mathbb{Z}_+^{Q_v} = \{x \in \mathbb{Z}^{Q_v} | x \neq 0, x_i \geq 0\}$). Корни x при $q(x) = 1$ называются *действительными* а при $q(x) = 0$ — *мнимыми*. Мнимые корни кратны минимальному мнимому положительному корню $\delta = \delta_G$.

Фиксируем нумерацию вершин в $\dot{Q} = \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$, и $\circ Q = \{j_1, i_2, \dots, j_n\}$ (для определенности будем считать что узловая точка, если она одна, лежит в $\dot{Q}$; будем вершины из $\circ Q$ обозначать также как $i_{m+k} = j_k, k \in \overline{1, n}$). Пусть $x \in \mathbb{R}^{Q_v}$, $x_k = x(i_k)$, при $k \in \overline{1, m+n}$, c —преобразование Кокстера на $\mathbb{R}^{Q_v}$, $c = \sigma_{i_{n+m}} \cdots \sigma_{i_2} \sigma_{i_1}$, $(\sigma_{i_k}(x))_k = -x_k + \sum_{l, i_l - i_k} x_l$, $(\sigma_{i_k}(x))_l = x_l$ при $l \neq k$. Ясно, что $\sigma_i^2 = \text{id}$ при $i \in \overline{1, n+m}$. Поэтому $c^{-1} = \sigma_{i_1} \sigma_{i_2} \cdots \sigma_{i_{n+m}}$. Будем также пользоваться обозначениями $\dot{c} = \sigma_{i_n} \cdots \sigma_{i_2} \sigma_{i_1}$, $\circ c = \sigma_{i_{m+n}} \cdots \sigma_{i_{m+2}} \sigma_{i_{m+1}}$ и называть эти преобразования отражениями Кокстера ($\dot{c}^2 = \text{id}$, $\circ c^2 = \text{id}$). Обозначим $\dot{c}_k = \underbrace{\dots \dot{c} \dot{c} \dot{c}}_{k \text{ раз}}$, $\circ c_k = \underbrace{\dots \circ c \circ c}_{k \text{ раз}}$, $k \in \mathbb{N}$. Вектор $x \in \mathbb{R}_+^{G_v}$ *регулярен*, если $c^t(x) \in \mathbb{R}_+^{G_v}$ при любом $t \in \mathbb{Z}$ и *сингулярен* в противном случае (терминология восходит к [10]).

Представление T колчана Q *сингулярно*, если T неразложимо, конечномерно и его размерность d — сингулярный вектор; T *регулярно*, если T неразложимо, конечномерно и не сингулярно.

Пусть $\delta_G = (\delta_1, \dots, \delta_m, \delta_{m+1}, \dots, \delta_{m+n})$. Построим линейную форму

$$L_G(x) = \sum_{i_k \in \dot{G}} \delta_k x_k - \sum_{i_{m+k} \in \circ G} \delta_{m+k} x_{m+k}, \quad x \in \mathbb{R}^{G_v}.$$

Справедливо утверждение (см., например, [11]): пусть G — расширенный граф Дынкина; для того чтобы корень $x \in \mathbb{R}^{G_v}$ был сингулярен, необходимо и достаточно, чтобы $L_G(x) \neq 0$.

Отметим, что у графа Дынкина все корни действительны и сингулярны, у расширенного графа Дынкина все мнимые корни регулярные, а вот действительные корни разбиваются на два сорта (действительные сингулярные и действительные регулярные). Для колчана Q , граф которого G есть расширенный граф Дынкина, справедливо утверждение:


Лемма 4. (см. [12]) Если T есть неразложимое в $\text{Rep}(Q)$ регулярное представление колчана Q , граф G которого есть расширенный граф Дынкина, то T — шуровское представление тогда и только тогда когда $\dim T = d \leq \delta_G$.

Докажем следующее утверждение:

Лемма 5. Пусть G — расширенный граф Дынкина, $d \in \mathbb{Z}_+^G$ корень графа G , удовлетворяющий условию $d < \sigma_G$. Тогда либо d — неточный корень (одна из координат нулевая), либо получается из некоторого неточного корня $\tilde{d}$ применением отражений Кокстера $\overset{\bullet}{s}$ и $\overset{\circ}{s}$.

Доказательство. Достаточно показать, что такой точный корень можно отражениями Кокстера преобразовать в неточный корень $\tilde{d}$.

Рассмотрим граф $\tilde{D}_n$



Пусть $d = (d_{a_1}, d_{a_2}, d_{z_1}, \dots, d_{z_{n-3}}, d_{b_1}, d_{b_2})$. Как известно,

$$\delta_{\tilde{D}_n} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ & & 1 & & & 1 \end{pmatrix}$$

(координаты вектора располагаются так же, как соответствующие вершины в графе). Так как d — точный корень, то $d_{a_1} = d_{a_2} = d_{b_1} = d_{b_2} = 1$. Назовём *отмеченным* первый индекс k , для которого $x_{z_k} = 1$ (т.е. $x_{z_1} = x_{z_2} = \dots = x_{z_{k-1}} = 2$). Пусть, для определённости, $z_{k-1} \in \overset{\bullet}{G}$. Тогда у $\overset{\bullet}{s}d$ координаты $x_{a_1}, x_{a_2}, x_{z_1}, \dots, x_{z_{k-2}}$ совпадают с соответствующими координатами вектора d , а $x_{z_{k-1}} = 1$, т.е. отмеченный индекс уменьшается на единицу. Применяя к $\overset{\bullet}{s}d$ преобразование $\overset{\circ}{s}$, продолжим этот процесс. В результате мы придём к вектору, у которого отмеченный индекс равен 1, а стало быть на следующем шаге получим вектор, у которого $x_{a_1} = x_{a_2} = 0$, это и будет искомым неточный вектор $\tilde{d}$.

Для графов $\tilde{E}_6, \tilde{E}_7, \tilde{E}_8$ результат можно получить аналогичными рассуждениями или, в крайнем случае, прямым перебором (положительных корней d таких, что $d < \delta_G$, конечное число).

$\delta_{\tilde{A}_n} = (1, 1, \dots, 1)$, так что из условия $d < \delta_{\tilde{A}_n}$ следует, что одна из координат нулевая и d есть неточный вектор. $\square$

3. Функторы Кокстера и ортоскалярные представления, размерности которых есть действительные корни

Пусть $g \in Q_v$ и Π_g — простейшее представление колчана $Q : \Pi_g(g) = \mathbb{C}$, $\Pi_g(i) = 0$ при $i \neq g$, $i \in Q_v$. Ясно, что если f_g — характер представления Π_g , то $f_g(g) = 0$; будем предполагать, что $f_g(i) > 0$ при $i \neq g$.

Обозначим через $\text{Rep}(Q, d, \chi)$ полную подкатегорию неразложимых представлений из $\text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$ с фиксированными размерностью d и характером χ . Если в $\text{Rep}(Q, d, \chi)$ не входит простейшее представление, то $\chi(i) > 0$ для $d(i) \neq 0$ (в силу неразложимости представлений).

В [2] были введены *функторы отражений Кокстера* $\overset{\bullet}{F}$ и $\overset{\circ}{F}$:

$$\overset{\circ}{F} : \text{Rep}(Q, d, \chi) \rightarrow \text{Rep}(Q, \overset{\circ}{c}(d), \overset{\circ}{\chi}),$$

$$\overset{\bullet}{F} : \text{Rep}(Q, d, \chi) \rightarrow \text{Rep}(Q, \overset{\bullet}{c}(d), \overset{\bullet}{\chi}),$$

где

$$\begin{aligned} \overset{\circ}{d}(i) = \overset{\circ}{c}(d)(i) &= \begin{cases} -d(i) + \sum_{j:j-i} d(j) & \text{при } i \in \overset{\circ}{Q} \\ d(i) & \text{при } i \in \overset{\bullet}{Q} \end{cases}, \\ \overset{\bullet}{d}(i) = \overset{\bullet}{c}(d)(i) &= \begin{cases} -d(i) + \sum_{j:j-i} d(j) & \text{при } i \in \overset{\bullet}{Q} \\ d(i) & \text{при } i \in \overset{\circ}{Q} \end{cases}, \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \overset{\circ}{\chi}(i) &= \begin{cases} -\chi(i) + \sum_{j:j-i} \chi(j) & \text{при } i \in \overset{\bullet}{Q}_v^T \\ \chi(i) & \text{при } i \notin \overset{\bullet}{Q}_v^T \end{cases}, \\ \overset{\bullet}{\chi}(i) &= \begin{cases} -\chi(i) + \sum_{j:j-i} \chi(j) & \text{при } i \in \overset{\circ}{Q}_v^T \\ \chi(i) & \text{при } i \notin \overset{\circ}{Q}_v^T \end{cases}, \end{aligned} \quad (12)$$

(здесь $\overset{\bullet}{Q}_v^T = Q_v^T \cap \overset{\bullet}{Q}$ и $\overset{\circ}{Q}_v^T = Q_v^T \cap \overset{\circ}{Q}$).

$\overset{\bullet}{F}$ и $\overset{\circ}{F}$ есть функторы эквивалентности категорий, и можно проверить, что их двукратное применение приводит к функтору, эквивалентному тождественному.

В дальнейшем будем пользоваться обозначениями $\overset{\circ}{F}_k = \underbrace{\overset{\circ}{F}\overset{\circ}{F}\overset{\circ}{F}}_{k \text{ раз}}, \overset{\bullet}{F}_k =$

$$\underbrace{\overset{\bullet}{F}\overset{\bullet}{F}\overset{\bullet}{F}}_{k \text{ раз}}.$$

Замечание 1. В [2] функторы отражений Кокстера вводятся в предположении, что граф G колчан Q не содержит циклов. Конструкция функторов $\overset{\bullet}{F}$, $\overset{\circ}{F}$ практически без изменений переносится на все однократные разделённые колчаны, и для них имеют место формулы (11-12).

Пусть $T \in \text{Rep}_{os}(Q, \mathcal{H})$, Q_v^T — носитель, $d_T = d_T(i)$ — размерность, $\{\chi_T = \chi_T(i)\}$ — характер представления T (напомним, что вне Q_v^T он определён неоднозначно). Будем придавать $\chi_T(i)$ при $i \in Q_v \setminus Q_v^T$ произвольные положительные значения, таким образом χ_T будет зависеть от $|Q_v| - |Q_v^T| = r$ положительных параметров.

Докажем теорему,

Теорема 2. *Если Q есть разделённый однократный колчан, граф G которого есть граф Дынкина, либо расширенный граф Дынкина, $d = \{d_i\}_{i \in Q_v}$ его точный (т.е. $d_i > 0$) действительный корень, то неразложимые ортоскалярные представления колчана Q в размерности d зависят от $|Q_v| - 1$ положительных параметров.*

Доказательство. а) Пусть d — действительный сингулярный корень графа G и T — неразложимое ортоскалярное представление размерности d , d получается из некоторого простейшего корня $d_g = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ отражениями Кокстера $\overset{\circ}{c}, \overset{\bullet}{c}$ (1 соответствует вершине g). Пусть, для определённости, $g \in \overset{\bullet}{G}$. Тогда для некоторого $k \in \mathbb{N}$, $d = \overset{\circ}{c}_k d_g$, а $T = \overset{\circ}{F}_k(\Pi_g)$. Π_g зависит от $|Q_v| - 1$ положительных параметров (положительных значений характера в вершинах $i \neq g$). От них же зависят скалярные операторы $\vec{T} \cdot \vec{T}^*$ при $i \in \overset{\bullet}{Q}$ и $T_j^{\downarrow*} \cdot T_j^{\downarrow}$ при $j \in \overset{\circ}{Q}$ в ненулевых пространствах. Соответствие между наборами параметров и неразложимыми ортоскалярными представлениями в размерности d взаимнооднозначное в силу обратимости преобразований $\overset{\circ}{c}, \overset{\bullet}{c}, \overset{\circ}{\chi}, \overset{\bullet}{\chi}$ и $\overset{\circ}{F}, \overset{\bullet}{F}$.

б) Пусть d — действительный регулярный корень графа G (для расширенного графа Дынкина) и T — неразложимое ортоскалярное представление размерности d . Если d — точный корень, то по лемме 5 он получается из некоторого неточного корня $\tilde{d}$ отражениями Кокстера $\overset{\circ}{c}, \overset{\bullet}{c}$. Пусть (для определённости) $d = \overset{\circ}{c}_k \tilde{d}$. Ортоскалярное представление $\tilde{T}$ в размерности $\tilde{d}$ можно рассматривать как точное представление колчана, соответствующего графу Дынкина. Если $Q_v^{\tilde{T}}$ — носитель представления $\tilde{T}$, то $\tilde{T}$ зависит по вышеизложенному от $|Q_v^{\tilde{T}}| - 1$ положительных параметров. Значения характера представления $\tilde{T}$ в точках $Q_v \setminus Q_v^{\tilde{T}}$ положим равными произвольным положительным числам: $T = \overset{\circ}{F}_k(\tilde{T})$, представление T зависит от $|Q_v \setminus Q_v^{\tilde{T}}| + |Q_v^{\tilde{T}}| - 1 = |Q_v| - 1$ положительных параметров. $\square$

4. Ортоскалярные представления, размерности которых есть мнимые корни

Пусть Q — разделённый однократный колчан, граф которого G есть расширенный граф Дынкина. Из теоремы 1 и леммы 4 следует, что единственный мнимый корень, который может быть размерностью неразложимого ортоскалярного представления колчана Q есть δ_G .

Докажем теорему аналогичную теореме 2, но относящуюся к мнимым корням графа G (заметим, что в случае $\chi_T = \delta_G$ для графов $\tilde{D}_4, \tilde{E}_6, \tilde{E}_7$ на другом языке и другими методами унитарная классификация неразложимых представлений получена в [13]-[15]).

Теорема 3. *Если Q есть разделённый однократный колчан, граф G которого есть расширенный граф Дынкина, то в размерности δ_G неразложимые ортоскалярные представления колчана Q зависят от $|Q_v| + 1$ положительных параметров.*

Теорему докажем фактическим описанием всех неразложимых представлений указанных колчанов в размерностях δ_G .

а) Пусть $G = \tilde{A}_n$ — цикл с n вершинами. Из предположения о разделённости и однократности колчана следует, что n чётное и $n \geq 4$. $\delta_{\tilde{A}_n} = (1, 1, \dots, 1)$. Представление T в размерности $\delta_{\tilde{A}_n}$ задаётся n ненулевыми комплексными числами. Переходом к унитарноэквивалентному представлению $n - 1$ число можно сделать положительным ($|Q_v| - 1$ параметр); допустимые преобразования, не меняющие значения этих параметров, не меняют и n -е число (зависящее от 2-х положительных параметров — аргумента и модуля). Таким образом, T зависит от n параметров, принимающих произвольные положительные значения, и одного параметра ϕ , принимающего значения на отрезке $(0, 2\pi]$, т.е. от $|Q_v| + 1 = n + 1$ параметров.

б) Пусть $G = \tilde{D}_n$ ($n \geq 4$):

$$\begin{array}{c} a_1 \quad \bullet \quad c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_{n-4} \quad c_{n-3} \quad \bullet \quad b_1 \\ \quad \diagdown \quad \diagup \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \diagdown \quad \diagup \\ a_2 \quad \bullet \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \bullet \quad b_2 \end{array}, \quad \delta_{\tilde{D}_n} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & 1 \\ & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & \\ & & 1 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Пусть T — неразложимое ортоскалярное представление размерности $\delta_{\tilde{D}_n}$ соответствующего разделённого колчана Q . Для определённости, будем считать, что $c_1 \in \dot{Q}$.

Для удобства введём обозначения и нумерацию матриц представления следующим образом:

$$\begin{aligned} A_1 &= T_{c_1, a_1}, \quad A_2 = T_{c_1, a_2}, \quad X_1 = T_{c_1, c_2}, \quad X_2 = T_{c_3, c_2}, \quad \dots \\ B_1 &= T_{c_{n-3}, b_1}, \quad B_2 = T_{c_{n-3}, b_2} \quad \text{при } n \text{ чётном и} \\ B_1 &= T_{b_1, c_{n-3}}, \quad B_2 = T_{b_2, c_{n-3}} \quad \text{при } n \text{ нечётном.} \end{aligned}$$

Рассмотрим случай чётного n . При $n = 4$ ортоскалярные неразложимые представления графа Q в размерности $\delta_{\bar{D}_4}$ зависят (см. [7]) от $6 = |Q_v| + 1$ положительных параметров.

Пусть $n > 4$. Допустимыми (унитарными) преобразованиями матриц представления матрицы $X_1, X_2, \dots, X_{n-4}$ можно диагонализировать с неотрицательными числами на диагоналях. Пусть $A = [A_1 | A_2]$, $X_i = \begin{bmatrix} x_i & 0 \\ 0 & y_i \end{bmatrix}$, $B = [B_1 | B_2]$, $i \in \overline{1, n-4}$. Тогда из условий ортоскалярности представления мы легко получаем, что матрицы AA^* и BB^* также диагональны. Пусть

$$AA^* = \begin{bmatrix} x_0^2 & 0 \\ 0 & y_0^2 \end{bmatrix}, \quad BB^* = \begin{bmatrix} x_{n-3}^2 & 0 \\ 0 & y_{n-3}^2 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Тогда условия ортоскалярности выглядят так:

$$\begin{bmatrix} x_0^2 & 0 \\ 0 & y_0^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{i+1}^2 & 0 \\ 0 & y_{i+1}^2 \end{bmatrix} = \chi_{c_{i+1}} I_{c_{i+1}}, \quad i \in \overline{0, n-4},$$

и поэтому $x_i^2 + x_{i+1}^2 = y_i^2 + y_{i+1}^2$, а значит

$$y_{i+1}^2 = x_{i+1}^2 + (-1)^i (x_0^2 - y_0^2), \quad i \in \overline{0, n-4}. \quad (14)$$

Если $x_0^2 = y_0^2$ (либо $x_j^2 = y_j^2$ для любого фиксированного j), то из (14) следует, что $x_i^2 = y_i^2$ для $i \in \overline{0, n-3}$. В этом случае матрица

$$[A_1 | A_2 | B_1 | B_2] \quad (15)$$

задаёт ортоскалярное представление $\hat{T}$ колчана $\hat{Q}$, соответствующего графу $\bar{D}_4$, и при переходе к эквивалентному представлению колчана Q , не меняющему приведенного вида матриц X_i , мы получаем переход к представлению колчана $\hat{Q}$, эквивалентному представлению $\hat{T}$. Такие представления колчана $\hat{Q}$, как мы отметили выше, зависят не более, чем от 6 параметров. Соответствующие представления колчана Q (учитывая параметры $x_1, x_2, \dots, x_{n-4}$ и (14)) зависят не более чем от $6 + (n-4) = n+2 = |Q_v| + 1$ параметров.

Пусть $x_i \neq y_i$ при $i \in \overline{0, n-3}$ и $(U_i)_{i \in G_v}$ осуществляют эквивалентность представления T с ортоскалярным представлением $\tilde{T}$, для которого $\tilde{X}_i = X_i$, $i \in \overline{0, n-4}$ (U_i — унитарные матрицы). В этом случае легко убедиться, что

$$U_i = \begin{bmatrix} u_i & 0 \\ 0 & v_i \end{bmatrix}$$

Таковыми преобразованиями в матрице $[A | B] = \left[\begin{array}{c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} & b_{22} \end{array} \right]$ можно все элементы, кроме 2-х, для определённости, b_{21} и b_{22} , сделать вещественными, и параметризовать следующим образом:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{c|c|c|c} x_0 \cos \phi_1 & x_0 \sin \phi_1 & x_{n-3} \cos \phi_2 & x_{n-3} \sin \phi_2 \\ y_0 \sin \phi_1 & -y_0 \cos \phi_1 & y_{n-3} \sin \phi_2 e^{i\theta} & -y_{n-3} \cos \phi_2 e^{i\theta} \end{array} \right]$$


(здесь мы воспользовались тем, что

$$AA^* = \begin{bmatrix} x_0^2 & 0 \\ 0 & y_0^2 \end{bmatrix}, \quad \text{и} \quad BB^* = \begin{bmatrix} x_{n-3}^2 & 0 \\ 0 & y_{n-3}^2 \end{bmatrix}.$$

Такие представления зависят от $n + 2 = |Q_v| + 1$ положительных параметров $x_0, x_1, \dots, x_{n-3}, y_0, \phi_1, \phi_2, \theta$.

Случай нечётного n изучается аналогично с заменой матрицы $[A_1 \mid A_2 \mid B_1 \mid B_2]$ на матрицу $[A_1 \mid A_2 \mid B_1^* \mid B_2^*]$

с) Пусть $G = \tilde{E}_6$; соответствующий разделенный колчан Q имеет вид



Пусть T — неразложимое ортоскалярное представление колчана Q в размерности $\delta_{\tilde{E}_6}$,

$$T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & C_1 \\ \hline 0 & B_1 & 0 \\ \hline A_1 & 0 & 0 \\ \hline A_2 & B_2 & C_2 \\ \hline \end{array}$$

Здесь $A_1 = T_{a_1, a_2}$; $B_1 = T_{b_1, b_2}$; $C_1 = T_{c_1, c_2}$; $A_2 = T_{z, a_2}$; $B_2 = T_{z, b_2}$; $C_2 = T_{z, c_2}$. Матрица A_1 имеет размерность 1×2 . Унитарными преобразованиями столбцов приведём её к виду $A_1 = [0 \ x_0]$, $x_0 > 0$. Унитарными пре-

образованиями строк матрицу $A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$ можно привести к виду

$$A_2 = \begin{bmatrix} x_1 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \\ 0 & a_{32} \end{bmatrix}, \quad x_1 > 0 \text{ и из ортогональности столбцов матрицы } \begin{array}{|c|} \hline A_1 \\ \hline A_2 \\ \hline \end{array} \text{ следует } a_{12} = 0.$$

$$D = [A_2 \mid B_2 \mid C_2] = \left[\begin{array}{cc|cc|cc} x_1 & 0 & b_{11} & b_{12} & c_{11} & c_{12} \\ 0 & a_{22} & b_{21} & b_{22} & c_{21} & c_{22} \\ 0 & a_{32} & b_{31} & b_{32} & c_{31} & c_{32} \end{array} \right].$$

Унитарными преобразованиями столбцов (не меняя A_2) можно добиться, чтобы $b_{11} = 0$, $c_{11} = 0$; $b_{12} \neq 0$, $c_{12} \neq 0$, иначе, можно проверить, представление разложимо; допустимыми преобразованиями можно сделать b_{12} и c_{12} положительными. Унитарными преобразованиями двух последних строк матрицы

D можно сделать $b_{22} = 0$, а тогда из ортогональности первых двух строк получим, что $c_{22} = 0$. Итак,

$$D = [\begin{array}{c|c|c} A_2 & B_2 & C_2 \end{array}] = \left[\begin{array}{cc|cc|cc} x_1 & 0 & 0 & b_{12} & 0 & c_{12} \\ 0 & a_{22} & b_{21} & 0 & c_{21} & 0 \\ 0 & a_{32} & b_{31} & b_{32} & c_{31} & c_{32} \end{array} \right].$$

Значения характера χ_i ($i \in Q_v$) связаны соотношением

$$\chi_{a_1} + \chi_{b_1} + \chi_{c_1} + 3\chi_x = 2(\chi_{a_2} + \chi_{b_2} + \chi_{c_2})$$

(следует сумму квадратов модулей матричных элементов матрицы T подсчитать двумя способами — сначала складывая эти квадраты модулей по строкам, а потом по столбцам). Это дает возможность перейти к нормированному представлению со значением характера $\chi_z = 1$, поделив все матрицы представления на одно и то же число $\sqrt{\chi_z}$ (нормировка представления не меняет минимального числа параметров, от которых зависит представление).

Вектор (x_1, b_{12}, c_{12}) , где $x_1 > 0$, $b_{12} > 0$, $c_{12} > 0$ и $x_1^2 + b_{12}^2 + c_{12}^2 = 1$, может быть параметризован следующим образом

$$(x_1, b_{12}, c_{12}) = (\sin \psi_1, \sin \phi_1 \cos \psi_1, \cos \phi_1 \cos \psi_1),$$

где $0 < \phi_1 < \frac{\pi}{2}$, $0 < \psi_1 < \frac{\pi}{2}$. Унитарными преобразованиями столбцов элементы a_{22}, b_{21}, c_{21} могут быть сделаны неотрицательными. Так как $a_{22}^2 + b_{21}^2 + c_{21}^2 = 1$, то вектор (a_{22}, b_{21}, c_{21}) может быть параметризован следующим образом:

$$(a_{22}, b_{21}, c_{21}) = (\cos \phi_2 \cos \psi_2, \sin \phi_2 \cos \psi_2, \sin \psi_2),$$

где $0 \leq \phi_2 \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \psi_2 \leq \frac{\pi}{2}$, $\phi_2 \cdot \psi_2 \neq 0$ (иначе представление разложимо).

Умножением 3-й строки матрицы D на элемент вида $e^{i\phi}$ (унитарное преобразование строк) сделаем элемент c_{31} вещественным неотрицательным

$$a_{32}\bar{a}_{32} + b_{31}\bar{b}_{31} + b_{32}\bar{b}_{32} + c_{31}^2 + c_{32}\bar{c}_{32} = 1$$

Пусть

$$a_{32}\bar{a}_{32} + b_{31}\bar{b}_{31} + c_{31}^2 = \sin^2 \psi_3, \quad b_{32}\bar{b}_{32} + c_{31}^2 = \cos^2 \psi_3. \quad (16)$$

Учитывая ортогональность 1-й и 3-й строки матрицы D и (16), вектор (b_{32}, c_{33}) может быть пропараметризован так:

$$(b_{32}, c_{33}) = (-\cos \phi_1 \cos \psi_3 e^{i\theta_1}, \sin \psi_1 \cos \psi_3 e^{i\theta_1})$$

Учитывая (16) вектор (a_{32}, b_{31}, c_{31}) может быть пропараметризован так:

$$(a_{32}, b_{31}, c_{31}) = (\cos \phi_3 \cos \psi_4 \sin \phi_3 e^{i\theta_2}, \sin \phi_3 \cos \psi_4 \sin \phi_3 e^{i\theta_3}, \sin \psi_4 \sin \psi_3).$$

Таким образом, в матрице D , которую мы будем называть *основой представления*,

$$\begin{aligned} A_2 &= \begin{bmatrix} \sin \psi_1 & 0 \\ 0 & \cos \phi_2 \cos \psi_2 \\ 0 & \cos \phi_3 \cos \psi_4 \sin \psi_3 e^{i\theta_2} \end{bmatrix} \\ B_2 &= \begin{bmatrix} 0 & \sin \phi_1 \cos \psi_1 \\ \sin \phi_2 \cos \psi_2 & 0 \\ \sin \phi_3 \cos \psi_4 \sin \psi_3 e^{i\theta_3} & -\cos \phi_1 \cos \psi_3 e^{i\theta_1} \end{bmatrix} \\ C_2 &= \begin{bmatrix} 0 & \cos \phi_1 \\ \sin \phi_2 & 0 \\ \sin \psi_4 \sin \psi_3 & \sin \phi_1 \cos \psi_3 e^{i\theta_1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Следовательно, основа представления, зависит от вещественных параметров

$$\phi_1, \phi_2, \phi_3, \psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4, \theta_1, \theta_2, \theta_3. \quad (17)$$

Из условий ортоскалярности следует, что строки матрицы D должны быть ортонормированы. Из ортогональности 2-й и 3-й строки имеем соотношение:

$$\begin{aligned} &\cos \phi_2 \cos \phi_3 \cos \psi_2 \sin \psi_3 \cos \psi_4 e^{i\theta_2} + \sin \phi_2 \sin \phi_3 \cos \psi_2 \sin \psi_3 \cos \psi_4 e^{i\theta_3} + \\ &+ \sin \psi_2 \sin \psi_3 \sin \psi_4 = 0, \end{aligned}$$

которому соответствует 2 "вещественных" соотношения — равенство нулю вещественной и мнимой части. Следовательно, среди параметров (17) только $8 = |Q_v| + 1$ независимых.

Покажем, что основой D ортоскалярное представление T определяется однозначно.

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{array}{|cc|} \hline 0 & x_0 \\ \hline x_1 & 0 \\ 0 & a_{22} \\ 0 & a_{32} \\ \hline \end{array}, \quad x_0 > 0.$$

Из равенства длин столбцов следует $x_0^2 + a_{22}^2 + a_{32}\overline{a_{32}} = x_1^2$, так что положительное число x_0 по основе представления определяется однозначно.

$$\begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{array}{|cc|} \hline b_{01} & b_{02} \\ \hline 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & b_{32} \\ \hline \end{array}, \quad \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{array}{|cc|} \hline c_{01} & c_{02} \\ \hline 0 & c_{12} \\ c_{21} & 0 \\ c_{31} & c_{32} \\ \hline \end{array}$$

Унитарными преобразованиями строк элементы b_{01} и c_{01} можно сделать вещественными неотрицательными:

$$b_{01} = y_0, \quad b_{02} = y_1 e^{i\theta}.$$

Из условий ортоскалярности вытекает, что

$$\begin{aligned} b_{01}^2 + b_{21}^2 + |b_{31}|^2 &= |b_{02}|^2 + b_{12}^2 + |b_{32}|^2, \quad \text{так что} \\ b_{01}^2 - |b_{02}|^2 &= b_{21}^2 + |b_{32}|^2 - b_{21}^2 - |b_{31}|^2 = s. \\ b_{01}b_{02} + \overline{b_{31}}b_{32} &= 0, \quad \text{так что} \end{aligned} \quad (18)$$

$$b_{01}b_{02} = b_{01}|b_{02}|e^{i\theta} = \sin \phi_3 \cos \psi_4 \sin \psi_3 \cos \phi_1 \cos \psi_3 e^{i(\theta_1 - \theta_3)}.$$

Поэтому $\theta = \theta_1 - \theta_3$ и

$$b_{01}^2 \cdot (-|b_{02}|^2) = -\sin^2 \phi_3 \cos^2 \psi_4 \sin^2 \psi_3 \cos^2 \phi_1 \cos^2 \psi_3 = -t \quad (19)$$


Стало быть числа b_{01}^2 и $-|b_{02}|^2$ есть корни квадратного уравнения

$$z^2 - s \cdot z - t = 0, \quad t > 0.$$

Уравнение имеет два вещественных корня разного знака, таким образом $|b_{01}|$, $|b_{02}|$ и θ определяются основной представлением однозначно.

Аналогично по основе представления однозначно определяются и числа s_{01} , s_{02} . Стало быть в размерности $\delta_{\tilde{E}_6}$ неразложимые ортоскалярные представления зависят не более чем от $|Q_v| + 1$, а неразложимые ортоскалярные представления общего положения в точности от $8 = |Q_v| + 1$ параметров.

d) Пусть $G = \tilde{E}_7$; соответствующий разделённый колчан имеет вид



Как известно, $\delta_{\tilde{E}_7} = 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1$

Пусть T — неразложимое ортоскалярное представление колчана Q в размерности $\delta_{\tilde{E}_7}$,

$$T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & A_{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{34} & A_{35} \end{bmatrix}$$

$$= \left[\begin{array}{c|ccc|cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & & & \\ a_{21} & a_{21} & a_{22} & a_{24} & & & \\ \hline & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} & a_{37} & a_{38} & a_{39} \\ & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} & a_{47} & a_{48} & a_{49} \\ & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} & a_{57} & a_{58} & a_{59} \\ & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} & a_{67} & a_{68} & a_{69} \\ \hline 0 & & 0 & & 0 & & a_{77} & a_{78} & a_{79} \\ & & & & & & a_{87} & a_{88} & a_{89} \end{array} \right] \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ a_{7,10} \\ a_{8,10} \end{array},$$

$$A_{11} = T_{a_2, a_1}; \quad A_{12} = T_{a_2, a_3}; \quad A_{22} = T_{z, a_3}; \quad A_{23} = T_{z, c_1};$$

$$A_{24} = T_{z, b_3}; \quad A_{34} = T_{b_2, b_3}; \quad A_{35} = T_{b_2, b_1}.$$

Допустимыми унитарными преобразованиями строк и столбцов некоторые из элементов матрицы T преобразуем в нули, некоторые из элементов станут равными нулю в силу ортогональности строк и столбцов внутри полос.

Символ $\bar{0}_k$ на каком-либо месте матрицы T будет означать, что на этом месте может быть получен ноль на k -м шаге унитарными преобразованиями столбцов вертикальной полосы, $0|_k$ — строк горизонтальной полосы, $\vec{0}_k$ — ноль получен в силу ортогональности столбцов вертикальной полосы, $0\downarrow_k$ — в силу ортогональности строк. При этом делая нули на k -м шаге, мы не "портим" нули, полученные ранее. Умножением строк и столбцов на числа вида $e^{i\phi}$ (унитарные преобразования) некоторые из элементов можно сделать вещественными неотрицательными, и мы на это укажем прямо в матрице ($a_{ij} \geq 0$ либо $a_{ij} \leq 0$). Мы указываем на строгое сравнение ($a_{ij} > 0$ либо $a_{ij} < 0$), если из равенства элемента a_{ij} нулю следует разложимость представления. В результате матрицу T можно привести к виду

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc|cc} a_{11} \geq 0 & 0|_{10} & a_{13} \geq 0 & a_{14} \leq 0 & 0 & 0 \\ a_{21} \geq 0 & a_{22} > 0 & a_{23} \leq 0 & \vec{0}_{11} & 0 & 0 \\ \hline 0 & a_{32} > 0 & \bar{0}_3 & \bar{0}_3 & a_{35} > 0 & \bar{0}_3 \\ 0 & a_{42} > 0 & a_{43} \geq 0 & \bar{0}_7 & a_{45} < 0 & \vec{0}_6 \\ 0 & 0|_4 & a_{53} \geq 0 & a_{54} \geq 0 & 0\downarrow_5 & a_{56} \geq 0 \\ 0 & 0|_4 & 0|_8 & a_{64} \geq 0 & 0\downarrow_5 & a_{66} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ A_{24} & 0 \\ A_{34} & A_{35} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \vec{0}_3 & \vec{0}_3 & a_{39} & 0 & 0 \\ a_{47} > 0 & \bar{0}_7 & 0|_2 & 0 & 0 \\ a_{57} \leq 0 & a_{58} \geq 0 & 0|_2 & 0 & 0 \\ 0\downarrow_9 & a_{68} & 0|_2 & 0 & 0 \\ \hline 0|_{10} & a_{78} \geq 0 & \bar{0}_1 & a_{7,10} \geq 0 & 0 \\ a_{87} \geq 0 & a_{88} \geq 0 & \bar{0}_1 & a_{8,10} \leq 0 & 0 \end{array} \right]$$

Нормируем представление T (будем считать, что $\chi_z = 1$). Тогда матрицу $D = \begin{bmatrix} A_{22} & A_{23} & A_{24} \end{bmatrix}$ (будем называть ее основой представления) можно

параметризовать следующим образом:

$$\begin{aligned}
 A_{22} &= \begin{bmatrix} \cos \phi_1 \cos \psi_1 & 0 & 0 \\ \sin \phi_1 \cos \psi_2 & \cos \phi_2 \sin \psi_2 & 0 \\ 0 & \sin \phi_2 \cos \psi_4 & \cos \phi_3 \cos \psi_3 \sin \psi_4 \\ 0 & 0 & \sin \phi_4 \sin \psi_5 \end{bmatrix} \\
 A_{23} &= \begin{bmatrix} \sin \phi_1 \cos \psi_1 & 0 \\ -\cos \phi_1 \cos \psi_2 & 0 \\ 0 & \sin \phi_3 \cos \psi_3 \sin \psi_4 \\ 0 & \cos \phi_4 \sin \psi_5 e^{i\theta_1} \end{bmatrix} \\
 A_{24} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sin \psi_1 \\ \sin \phi_2 \sin \psi_2 & 0 & 0 \\ -\cos \phi_2 \cos \psi_4 & \sin \psi_3 \sin \phi_4 & 0 \\ 0 & \cos \psi_5 e^{i\theta_2} & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Строки матрицы D ортонормированы, если дополнительно выполняется соотношение (означающее ортогональность 3-й и 4-й строк):

$$\begin{aligned}
 &\cos \phi_3 \sin \phi_4 \cos \psi_3 \sin \psi_4 \sin \psi_5 + \sin \phi_3 \cos \phi_4 \cos \psi_3 \sin \psi_4 \sin \psi_5 e^{i\theta_1} \\
 &\quad + \sin \psi_3 \sin \psi_4 \cos \psi_5 e^{i\theta_2} = 0.
 \end{aligned} \tag{20}$$

Это соотношение эквивалентно двум вещественным, так что из 11 параметров $\phi_1 - \phi_4$, $\psi_1 - \psi_5$, θ_1 , θ_2 независимыми являются $9 = |Q_v| + 1$.

Легко видеть, что по основе D представления T матрицы A_{11} , A_{12} , A_{34} , A_{35} (ранее частично приведенные) находятся однозначно.

Так из ортоскалярности столбцов матрицы $\begin{bmatrix} A_{24} \\ A_{34} \end{bmatrix}$ (т.е. из равенства $A_{24}^* A_{24} + A_{34}^* A_{34} = \chi_{b_3} I_{b_3}$) следует, что

$$\begin{aligned}
 a_{87}^2 + a_{47}^2 + a_{54}^2 &= a_{39}^2 \\
 a_{87} a_{88} + a_{54} a_{58} &= 0 \\
 a_{78}^2 + a_{88}^2 + a_{58}^2 + a_{68} \overline{a_{68}} &= a_{39}^2.
 \end{aligned}$$

Из этих равенств последовательно и однозначно находятся элементы a_{87} , a_{88} , a_{78} . Из ортоскалярности строк матрицы $\begin{bmatrix} A_{34} & A_{35} \end{bmatrix}$ (т.е. из равенства $A_{34} A_{34}^* + A_{35} A_{35}^* = \chi_{b_2} I_{b_2}$) следует, что

$$\begin{aligned}
 a_{78}^2 + a_{7,10}^2 &= a_{87}^2 + a_{88}^2 + a_{8,10}^2 \\
 a_{78} a_{88} + a_{7,10} a_{8,10} &= 0,
 \end{aligned}$$

откуда однозначно находятся элементы $a_{7,10}$ и $a_{8,10}$.

Параметризуем столбцы матрицы $\begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix}$ следующим образом:

$$\begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & x \sin \alpha_2 \sin \beta_2 & -x \sin \beta_3 \\ x \sin \beta_1 & -x \cos \alpha_2 \sin \beta_2 & 0 \\ x \cos \alpha_1 \cos \beta_1 & 0 & 0 \\ x \sin \alpha_1 \cos \beta_1 & x \sin \alpha_3 \cos \beta_2 & 0 \\ 0 & x \cos \alpha_3 \cos \beta_2 & x \sin \alpha_4 \cos \beta_3 \\ 0 & 0 & x \cos \alpha_4 \cos \beta_3 \end{bmatrix},$$

здесь $x > 0$.

Покажем, что элементы матрицы A_{12} элементами матрицы A_{22} определяются однозначно. Так как $x \cos \alpha_1 \cos \beta_1 = a_{32}$, $x \sin \alpha_1 \cos \beta_1 = a_{42}$, то $x^2 \cos^2 \beta_1 = a_{32}^2 + a_{42}^2$. Аналогично, $x^2 \cos^2 \beta_2 = a_{43}^2 + a_{53}^2$ и $x^2 \cos^2 \beta_3 = a_{54}^2 + a_{64}^2$. Поэтому

$$\begin{aligned} x \sin \beta_1 &= \sqrt{x^2 - (a_{32}^2 + a_{42}^2)} \\ x \sin \beta_2 &= \sqrt{x^2 - (a_{43}^2 + a_{53}^2)} \\ x \sin \beta_3 &= \sqrt{x^2 - (a_{54}^2 + a_{64}^2)} \end{aligned}$$

Из ортогональности столбцов матрицы $\begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix}$ следует


$$\begin{aligned} -x^2 \sin \beta_1 \sin \beta_2 \cos \alpha_2 + a_{42}a_{43} &= 0 \\ -x^2 \sin \beta_2 \sin \beta_3 \sin \alpha_2 + a_{53}a_{54} &= 0 \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \cos \alpha_2 &= \frac{a_{42}a_{43}}{\sqrt{[x^2 - (a_{32}^2 + a_{42}^2)] \cdot [x^2 - (a_{43}^2 + a_{53}^2)]}} \\ \sin \alpha_2 &= \frac{a_{53}a_{54}}{\sqrt{[x^2 - (a_{54}^2 + a_{64}^2)] \cdot [x^2 - (a_{43}^2 + a_{53}^2)]}} \end{aligned}$$

Значение $x = \chi_{a_3}$ определяется по основе представления однозначно: если A_{22} унитарно эквивалентна матрице $\text{diag}\{r_1, r_2, r_3\}$, $r_i \geq 0$, то $x = \max_i r_i$ (это легко получить, диагонализировав матрицы A_{12} , A_{22} унитарными преобразованиями, при этом существенно используется ортоскалярность представления). Элементы a_{11} , a_{21} однозначно находятся по матрице A_{12} (аналогично тому, как находятся элементы $a_{7,10}$, $a_{8,10}$ по матрице A_{34}).

е) Пусть $G = \tilde{E}_8$; соответствующий разделенный колчан имеет вид



Как известно,

$$\delta_{\tilde{E}_8} = \begin{matrix} & & & & & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 4 & 2 \end{matrix}$$

Пусть T — неразложимое ортоскалярное представление колчана Q в размерности $\delta_{\tilde{E}_8}$,

$$T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} & A_{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & A_{45} \end{bmatrix},$$

где

$$\begin{aligned} A_{11} &= T_{a_2, a_1}; \quad A_{12} = T_{a_2, a_3}; \quad A_{22} = T_{a_4, a_3}; \quad A_{23} = T_{a_4, a_5}; \\ A_{33} &= T_{z, a_5}; \quad A_{34} = T_{z, c_1}; \quad A_{35} = T_{z, b_2}; \quad A_{45} = T_{b_1, b_2}. \end{aligned}$$

Допустимыми унитарными преобразованиями строк и столбцов некоторые из элементов матрицы T преобразуем в нули, некоторые из элементов станут равными нулю в силу ортогональности строк и столбцов внутри полюсов. Следуя предыдущим договорённостям об обозначениях, матрицу T можно привести к виду, при котором

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} a_{11} > 0 & a_{12} > 0 & \overrightarrow{0}_{26} & \overrightarrow{0}_{26} \\ 0 \downarrow_{27} & O \downarrow_{25} & a_{23} > 0 & a_{24} < 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} A_{23} \\ A_{33} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} a_{35} > 0 & \overrightarrow{0}_{17} & \overrightarrow{0}_{17} & \overrightarrow{0}_{17} & \overrightarrow{0}_{17} \\ 0 \downarrow_{16} & a_{46} > 0 & a_{47} < 0 & \overrightarrow{0}_{19} & \overrightarrow{0}_{19} \\ 0 \downarrow_{16} & 0 \downarrow_{18} & a_{57} > 0 & a_{58} < 0 & \overrightarrow{0}_{21} \\ 0 \downarrow_{16} & 0 \downarrow_{18} & 0 \downarrow_{20} & a_{59} > 0 & a_{69} < 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} A_{23} \\ A_{33} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} a_{75} > 0 & \overrightarrow{0}_2 & \overrightarrow{0}_2 & \overrightarrow{0}_2 & \overrightarrow{0}_2 \\ 0 \downarrow_1 & a_{86} \geq 0 & \overrightarrow{0}_6 & \overrightarrow{0}_6 & \overrightarrow{0}_6 \\ 0 \downarrow_1 & a_{96} \geq 0 & a_{97} \geq 0 & \overrightarrow{0}_7 & \overrightarrow{0}_7 \\ 0 \downarrow_1 & 0 \downarrow_7 & a_{10,7} \geq 0 & a_{10,8} \geq 0 & \overrightarrow{0}_{11} \\ 0 \downarrow_1 & 0 \downarrow_7 & 0 \downarrow_{10} & a_{11,8} \geq 0 & a_{11,9} \geq 0 \\ 0 \downarrow_1 & 0 \downarrow_7 & 0 \downarrow_{10} & a_{12,9} \geq 0 & a_{12,9} \geq 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} A_{34} & A_{35} \\ 0 & A_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{7,10} > 0 & \bar{0}_2 & \bar{0}_2 & a_{7,13} > 0 & \bar{0}_2 & \bar{0}_2 & \bar{0}_2 \\ a_{8,10} > 0 & \bar{0}_6 & \bar{0}_6 & a_{8,13} < 0 & a_{8,14} > 0 & \bar{0}_6 & \bar{0}_6 \\ 0|_3 & a_{9,11} > 0 & \bar{0}_7 & 0|_4 & a_{9,14} < 0 & \bar{0}_9 & \bar{0}_9 \\ 0|_3 & a_{10,11} < 0 & \bar{0}_{13} & 0|_4 & 0|_8 & a_{10,15} > 0 & \bar{0}_{14} \\ 0|_3 & 0|_{14} & a_{11,12} \geq 0 & 0|_4 & 0|_8 & a_{11,15} < 0 & a_{11,16} \geq 0 \\ 0|_3 & 0|_{14} & a_{12,12} & 0|_4 & 0|_8 & 0|_{15} & a_{12,16} \\ \hline 0 & 0 & 0 & a_{13,13} > 0 & a_{13,14} > 0 & 0_5 & 0_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0|_5 & 0|_5 & a_{14,15} > 0 & a_{14,16} > 0 \end{bmatrix}$$

Основу представления $D = \begin{bmatrix} A_{33} & A_{34} & A_{35} \end{bmatrix}$ можно параметризовать следующим образом

$$\begin{aligned} a_{75} &= \sin \psi_1, \quad a_{7,10} = \cos \phi_1 \cos \psi_1, \quad a_{7,13} = \sin \phi_1 \cos \psi_1 \\ a_{86} &= \sin \phi_2 \sin \psi_2, \quad a_{8,10} = \sin \phi_1 \cos \psi_2, \quad a_{8,13} = -\cos \phi_1 \cos \psi_2, \\ a_{8,14} &= \cos \phi_2 \sin \psi_2 \\ a_{96} &= \cos \phi_2 \sin \psi_3, \quad a_{97} = \sin \phi_3 \cos \psi_3, \quad a_{9,11} = \cos \phi_3 \cos \psi_3; \\ a_{9,14} &= -\sin \phi_2 \sin \psi_3 \\ a_{10,7} &= \cos \phi_3 \sin \psi_4; \quad a_{10,8} = \sin \phi_4 \cos \psi_4; \quad a_{10,11} = -\sin \phi_3 \sin \psi_4; \\ a_{10,15} &= -\cos \phi_4 \cos \psi_4 \\ a_{11,8} &= \cos \phi_4 \cos \psi_4 \cos \psi_5; \quad a_{11,9} = \cos \phi_5 \sin \psi_5; \quad a_{11,12} = \sin \phi_5 \sin \psi_5; \\ a_{11,15} &= \sin \phi_4 \cos \psi_4 \cos \psi_5; \quad a_{11,16} = \sin \psi_4 \cos \psi_5 \\ a_{12,9} &= \cos \phi_6 \cos \psi_6; \quad a_{12,12} = \sin \phi_6 \cos \psi_6 e^{i\theta_1}; \quad a_{12,16} = -\sin \psi_6 e^{i\theta_2}. \end{aligned}$$

Строки матрицы D ортонормированы, если дополнительно выполняется соотношение (означающее ортогональность 5-й и 6-й строк):

$$\begin{aligned} \cos \phi_5 \cos \phi_6 \sin \psi_5 \cos \psi_6 + \sin \phi_5 \sin \phi_6 \sin \psi_5 \cos \psi_6 e^{i\theta_1} \\ - \sin \psi_4 \cos \psi_5 \sin \psi_6 e^{i\theta_2} = 0. \end{aligned}$$

Это соотношение эквивалентно двум вещественным.

Кроме того из ортоскалярности представления следует равенство длин столбцов (как векторов в унитарном пространстве) матрицы A_{34} , поэтому имеем еще 2 соотношения:

$$\begin{aligned} \cos^2 \phi_1 \cos^2 \psi_1 + \sin^2 \phi_1 \cos^2 \psi_2 &= \cos^2 \phi_3 \cos^2 \psi_3 + \sin^2 \phi_3 \sin^2 \psi_4 \\ \text{и} \quad \cos^2 \phi_1 \cos^2 \psi_1 + \sin^2 \phi_1 \cos^2 \psi_2 &= \sin^2 \phi_5 \sin^2 \psi_5 + \sin^2 \phi_6 \cos^2 \psi_6. \end{aligned}$$

Таким образом из 14 параметров $\phi_1 - \phi_6$, $\psi_1 - \psi_6$, θ_1 , θ_2 независимыми являются $10 = |Q_v| + 1$.

Также, как и в предыдущих случаях, легко показать, что по основе D представления T матрицы A_{11} , A_{12} , A_{22} , A_{23} , A_{45} (ранее частично приведенные) находятся однозначно.

Замечание 2. Неразложимые представления расширенных графом Дынкина в категории линейных пространств изучены в [16],[17].

Как и для категории линейных пространств, размерности неразложимых ортоскалярных представлений этих графов не ограничены в совокупности. В размерности, являющейся действительным корнем графа, при фиксированном характере, неразложимое представление единственно. Для размерностей, являющихся мнимыми корнями графа, неразложимые ортоскалярные представления, в отличие от линейно-алгебраического случая, существуют только в размерности совпадающей с минимальным положительным мнимым корнем, но также зависят, при фиксированном характере, от одного (комплексного) параметра.

Список литературы

- [1] Roiter A.V. Matrix problems // Proc. of ICM Helsinki. – 1975. – p. 319–322.
- [2] Кругляк С.А., Ройтер А.В. Локально-скалярные представления графов в категории гильбертовых пространств // Функци. анализ и прил. – 2005. – 39, вып. 2. – с. 13–30.
- [3] Gabriel P. Unzerlegbare Darstellungen I // Manuscripta Math. – 1972. – 6. – p. 71–107.
- [4] Кругляк С.А., Рабанович В.И., Самойленко Ю.С. О суммах проекторов. // Функци. анализ и прил. – 2002. – 36, вып. 3. – с. 20–35.
- [5] Островский В.Л., Самойленко Ю.С. Про спектральні теореми для сімей лінійно пов'язаних самостпряжених операторів із заданими спектрами, що асоційовані з розширеними графами Динкіна // Укр. мат. журн. – 2006. – 58, № 11. – с. 1556–1570.
- [6] Albeverio S., Ostrovskyi V., Samoilenko Yu. On functions on graphs and representations of a certain class of $\ast$ -algebras // J. Algebra. – 2007. – 308. – p. 567–582.
- [7] Кругляк С.А., Назарова Л.А., Ройтер А.В. Ортоскалярные представления колчанов в категории гильбертовых пространств // Записки научных семинаров ПОМИ. – 2006. – 338. – с. 180–199.
- [8] Ройтер А.В. Боксы с инволюцией // в кн.: Представления и квадратичные формы. 155, АН УССР, Ин-т мат., Киев. – 1979. – с. 124–126.
- [9] Кас V.G. Infinite root systems, representations of graphs and invariant theory, II. // J. Algebra. – 1982. – 78. – p. 141–162.
- [10] Gelfand I.M., Ponomarev V.A. Problems of linear algebra and classification of quadruples of subspaces in a finitedimensional vector space.// Coll. Math. Soc. J. Bolyai, 5, Hilbert Space Operators. – Tihany, (Hungary). – 1970.

- [11] Редчук И.К., Ройтер А.В. Сингулярные локально-скалярные представления колчанов в гильбертовых пространствах и разделяющие функции. // Укр. Мат. Журн. – 2004. – т. 56, № 6. – с. 796–809.
- [12] W. Crawley-Boevey, Lectures on Representations of Quivers. // <http://www.maths.leeds.ac.uk/~pmtwc/dmvlecs.pdf>
- [13] Ostrovskiy V.L., Samoilenko Yu.S. Introduction to the theory of representations of finitely presented *-algebras // Rev. Math. Math. Phys. – 1999. – vol. 11. – p. 1–261, Gordon&Breach, London.
- [14] Mellit A.S. On the case where a sum of three partial maps is equal to zero // Ukr. Math. J. – 2003. – 55, no. 9. – p. 1277–1283.
- [15] Ostrovskiy V.L. Representations of an algebra associated with the Dynkin graph $\tilde{E}_7$ // Ukrainian Math. J. – 2004. – 56, no. 9. – p. 1417–1428.
- [16] Назарова Л.А. Представления колчанов бесконечного типа. // Известия Академии Наук СССР, серия математическая. – 1973. – т. 37, с. 752–790.
- [17] Donovan P., Freislich M. The Representation Theory of Finite Graphs and Associated Algebras // Carleton Mathematical Lecture Notes, Ottawa. – 1973. – 5. – p. 1–187.

Roiter A.V.

Институт математики НАН Украины

Kruglyak S.A.

Институт математики НАН Украины

e-mail: krug@ehl.kiev.ua

Nazarova L.A.

Институт математики НАН Украины

e-mail: nazarovala@yahoo.co.uk